

7
1.
2. (1)
3.
4.
5.
6.
7.
2
1.
2..
5
1.
2.
3.
4.
5. : ,
9
1. 行 满 或苓
2. ④ 亏苓虚 满 或苓
3. 补摄 苓 归 行苓满 或苓
4. 脾溢健 满 行 满 或苓
5. 益(6) 益 尿 行 统益 虚 或苓
6. 益苓(7) 行统益苓 紫 或苓
7. 益苓(7) 亏苓统益 虚 行 或苓
8. 斑心 行统 亏悸苓 或苓

1+, - . / 0?, - . / 0 1? 12 / 0 1 3 4 3 5 6 7 8?
2+7 9 : ; ? 7 9 : < ? = > 7 ? @? A . B 7 C D 3?
3+ / 0 E : < 3 F G . , - ? H I ?
4+ J K < 3 L M , N (0 : P Q R S R T U V R W 5 X Y Z
5+ 7 9 缓 / ? A C [缓 / \ 3] . , - ?
6+ / 0 ^ _ 3 ` ; . , - ? a b c d 6 . , - ? J e f g h i z
7+ , - g j k . / 0 1 m 3 k ? n o k ^ / p q r s
t j k V W 5 , - ?
8+ n 悸 R / 0 , - u > v ? w R 3 v x y > z { ? | } v
3 ~ . . , - ? v / 0 3 ! R : > 7 " # ?
9+ 0 \$ E : P > 7 F G ? % K 嗽) & ' (w R 0 \$ 3
n) * + Z
10+ , - / < E / 0 3 P . > 7 F G ? / u 0 K / 0 R < 3 1 2 3 Z
11+ J K 0 3 L M S V T U 4 5 6 V R W 5 X Y Z
12+ 7 8 3 n) * 9 . , - ? a : ; : < . , - ?
13+ 7 8 7 8 => 养 , ? > @ 钠 / , - A B 纳 C , R D
E ?
14+ 纳 C 3 * 9 . , - ? a : ; : < . , - ? / 纳 C F k G H
5 6 7 8 ?
15+ 纳 C 养 Q R I > 7 8 J , - 参 K L M 7 8 R N O
P ?
16+ Q R 3 * 9 . , S ? a / k H T > 7 * + ? n) V R p U W
5 , - ? , - V W 支 X Y O Z & ?
17+ 期 [: , - \ ? / , - H T 紫] 8) ?
18+ ^ _ @ 0 , - H T ` 3 a b c d ? e I H T V
W 5 , - ?
19+ ^ _ E f g 味 3 ^ _ ! R : > 7 h ?
20+ 7 D 参 Z 3 ! R : > 7 * + ? n i j 7 8 E Z & 3 H T
R N 3 u k 0 . , - ? J l N Q m n Z
21 o G 7 8 , p R , 7 D 参 / q 3 : H T v r
m 7 8 E 纳 C , 7 8 . 纳 C E Z & , 7 8 E Z & h R / 0 ! R 3 " # Z
22+ s t u v : 7 w x 养 y z { | 3 钠 } ~ . \$
" 咽喉 (, - / R ` \$ 烈 3 西河 u j ? 2 / H T
> 7 * + ?
23+ 败毒 3 , - ? / H T 人 丸 3 5 6 7 8 ? a H T R N V B
7 掌握?

9. 足养 养 虚 统 或苓
4
1. 两 生 眩 晕 行晕满运 伤发晕 哮 缓期肾 哮
2. 钠 钠 晕 行晕金 晕 伤发晕 哮 丸七
3. 味 都味 苓晕 行苓晕 喘味 伤发晕 哮
纳阳参
4. 蛤饮 支蛤 水匱(7) 匱桂晕术满 伤发晕 哮
3
1. 苓晕 行苓晕 喘 甘消 哮
渴下紫阴晕 哮
2. 喘 水喘 晕 晕 匱 喘 渴下紫阴
晕 哮
3. 补晕 匱 匱虚 行晕 摄 渴下紫阴晕 哮
2
1. 丸味
2. 蛤 伤 消
3
1.
2.
3. ! " ! " # \$
% 匱 哮
1
1. & ' () *

190

24+ 败毒 , - 1 R : 陷里所 | i 痢疾? 7 } 痢疾 1 R ?
25+ , - 匱 > Q ? 匱虚 0 k 匱虚 k v
B 7 H T ?
26+ 再造 [7 8 甘消 1 础 , - / R 7 8 {
R 纳 C 8 芪? , 0 炒 F k 撮 3 5 6 7 8 ?
27+ 桂水 0 S R 于 , - \ ? V R p X W 5 , S ? J 0 减萎蕤
f g h i z
28+ J K 支 0 3 L M S V T U H T ` ; 6 V R W 5 X Y Z
29+ p 承 Q 承 i 承 肾 : 里 a : |
> 7 * + ? / k 期 ^ _ R N 6 , - / < > 7 异 h ? , - ?
30+ J K 支 0 3 S V \ 6 a H T 规律 Z
31+ J 4 析 p 8 8 p 承 p 8 甘消 物备急 哮 7 消 E 哮
3 H T 5 6 ?
32+ 苓 > p 8 , - . 支 0 ?
33+ 舟车 哮 n 使 R 3 r 9 . , - ?
34+ J 4 析 枣 舟车 哮 8 ^ _ , ! . , : , - < , 禁忌 (/ 面 3 异 h z
35+ 8 , - V W 支 支 0 1 H T 行虚 k ? 会 会留 ? , - ?
36+ 8 E 新 0 8 : 3 u ? @ . , - ? / H T | > 7
* + ? 8 , 0 撮桔梗 3 5 6 7 8 ?
37+ 增液承 E 新 0 8 3 立 < ^ / > 7 异 h ? B 7 ? @ V R ?
38+ 8 m 匱 , - u R < ? m 匱 3 / 0 , - 1 R : 疟疾?
39+ Q 3 * 9 . , - ? J l N 4 析) 并 R 6 H
T 人 丸 3 5 6 Z
40+ 蒿) S R 于 , - \ ? n) V R 3 辨 u + . , - ?
41+ J 比 M Q 蒿) 3 ^ _ ! R 6 S R \ i 异 h Z
42+ J 4 析 逆 3 : \ 6 H T 5 6 Z
43+ J 4 析 逍遥 3 : < 井 g h / , - 当或 F k
u k 物? 8 n) 悸 R B 7 v a ^ _ k N ? (限于 \ / 6 (7) 个 甘
/ 3 T U) +
44+ J 4 析 E 逍遥 3 H T 5 6 ! R : \ i 异 h Z
45+ J 4 析 u / 3 : < 6 / k H T 3 5 6 Z
46+ J 4 析 半夏 益 3 : < 6 / k H T 5 6 Z
47+ 益 7 肾 ` 苦 行 并 R H T ` ; { b c / k
6 R N ? 完全 G h ?
48+ 0 S R 于 z { \ ? 使 R p V W 5 { , - ?

49+ n SR白虎 3 uk0. , -?8 , - VW支X0人郑
50+白虎 EstZ& 8^_ HT !R6 : /面>7异h?
51+ 入 >7n)*9? HT 43^花 *_35
678?
52+犀角]8 : 入 4,迫 妄 i , 7R 3赤F
皮?
53+ 膈 3 >7*9?/ HTi 承 35678?
54+普下蛤毒味7 >:p头瘟? 7 8) 8* uk物?
55+ 瘟败毒味:[(7播\ 7 Z& k?p Q03
使RVB7掌握?
56+ : , - \?/ HT泽 车~消 木 当或
紫]356?
57+左伤哮: 经 7R` 3吴茱萸?
58+ 白 肺 7HR参K 粳米?
59+ HR升7 8 HR防 35678?
60 昔下蛤毒味 8 肾VR了[养i\3`; 但
bcRk?>所 h ?@78? , -?
61+玉女, = `参p 3Z& hp?HTpN桂水k
a 78?请 2/ : *+Q/u4析Z
62+白头翁 Fk 均 :痢i0 a/kHT>7?@?所
\>7 h?
63+R蒿鳖甲 3 >7*9?/ R蒿 鳖甲hR35678?
64+当或 8 7 > ?a/kHT>7*+?

65+新0 薏味 7HT` i品?2/E 薏 >7异h?n B
7?@使R?
66+王氏 李氏 &虚 /8^_ !R : +>7异h?

67+JK 里03LmkSV5 SVTU 8P624P819P4P819P25P30P53+D(25443240-53216D(+))Tj/F8749dPRD(4)/F245+1097253
68 Q建 @*+:? \. , -?/ kHT>7*+?E 纯C >7 回膈
@? 畏阳饮 /k Q
69+J比Mp Q建 3^_ !R6SV \i异hZ
70+回膈救逆<SR于, - \?aRkHTaRk,66SR

VR 桂水潜匿k?HT 川棟消 茵陈 紫麦芽35678?	165+J比M 参 期姜` EQR ^_ !R :3异h?
139+%K天7钩藤 3^_566 : 侯Z	166+J比M 参 期姜` 纳阳参 参姜 阳 QR
140+JK]8味消3^_56 !R6 :Z	/^_ !R :异hZ
141+JK:\$03LM SRTU 45 6使RW5XYZ	167+ 嗽 :P,-`;所 3}嗽? a/k^_3 N(0.,-?
142+ \$E \$3:P/<>7异h?	7}}嗽 1R? , -?
143+ \$救肺 >7*9?/k^_ 7=HT 虚 桂水k	168+J比M 嗽 苏 3^_ !R6 :3异hZ
却? ft Z& 且ftRN独重?	169+%K 哮 贝母瓜蒌 半夏白阳天7 3^_ !.
144+统水 肺 百 术伤 麦门冬 肾:肺 \$ 但立<	:6HT56Z
^/ Gh , -?JQ/u4析比MZ	170+蛤导0E 支08立< Rk6SV \ /面>7 h?n p
145+J比M百 术伤 } /(见 0)3异hZ	VB7?@使R?
146+麦门冬 :肺痿 / 7HT` {\$i半夏?请 2/	171+保 哮 蛤食导 i0 / 7R*_?
^_ !R6 :<%Ka 并ghbcHTpVW5{, -Z	172+保 哮 枳 导 哮 木 槟榔哮3/kHT6 : \>7
147+JK祛 03LM 45566SV \Z	异h?
148+@ :,- \?/kHT>7*+?n B70减VR?	173+J4析枳阳哮E 亏苓哮^_ HT6 : \i异hZ
149+ :P,- \? , - j k?JK2/E@	174+保 哮E 枳阳哮8 : 立< /kHT >7*+?
3异hZ	175+枳 蛤痞哮E 半夏 益 3 : /kHT>7异h?
150+茵陈蒿 3*9., -?/ HTp835678?2/ z	176+枳阳哮E 枳 蛤痞哮均 蛤行兼施i0 n B7?@使R?
}5\$38疸 1R? , -?	177+JK驱虫03Rk`;6VRW5XYZ
151+ E :,- \?/ HT>7*+?	178+JK乌梅哮3HT56 !.6 : *9Z
152+ :,- : ?/ HTp8 炙参K3R578?	179+ 虫哮E肥儿哮3/kHT !.6 :>7异h?
153+ 皮 肾> 喘祛 8/kHT >7 h? , -?	180+JK涌 03SV \6VRW5XYZ
154+%K 纳阳参 3 : \ :;:<6/kHT56Z	181+J比M瓜蒂 E 圣 3^_ !R6 :i异hZ
155+J比M E 苓 /^_ HT !R : (/面3异	182+%K急救稀涎 3HT56 !.*+6SV \Z
h+ 匱 喘HR白F 苓味 却R木瓜 =>7?@?	183+痈疡3 :< u>z{? SR于,- \?>否H VR?
156+ 苓 E舟车喈均1:P喘, 但 /^_ !R :	, -?
Gh , -?J :; :<Q%u比MZ	184+%K仙/ 命味3^_ !R : *96/ HT白芷
157+蠲痹 独 寄紫物3^_ !R :>7异h?	防 356Z , -疮疡 水 1R /?
158+A [\3LM.HI 3? 3x_Ez{脏腑FG最	185+匱 3 : \>7*+?/ , -使RpN 桂水k 6Q
密切? , -?	N78?(匱 /kHT*+ N)
159+祛 3Rk`;6 N(0., -?	186+%K 伤 :<6/kHT56Z
160+%K祛 03456 5祛 /03SV \Z	187+p8牡 E桃核承 均:; { 8支 所 3:
161+ 陈 3HT>7*+?n)B70减VR?(1丸考渴至/集 阴	但(7)/Rk Gh , -?
0减<)	188+p8牡 E 甘消败 均: 痈 但Rk 然 h
162+JK 3 :<6/kHT56Z	, -?J :<Q%u4析ghZ
163+礞Z滚 哮3 , , -?-<>7*+?	189+ 匱 Q 伤 均1:P脱 >7*+?
164+ 参 期姜` t 钠 苏消 肾>@ 钠 a /	190+x E 行8芪 (7)/ : 8:< >7 h?
kHT >7*+?	

性能
k > 性>? 期6或经
A>升 E >毒 毒归{ Z
E 属水 匱
行 匱 里 !.
并 毒 水? 匱
= i = : P p < Z
味
期` 参苦 酸 : P Q R h
、 养 参 行 急> 生
苦\$ > 水 > 支且
酸> 术涩? 喘u 全Z
情
G使 k k G U R !.
G > 它k毒 G 毒性 限
G L增毒u G H T !. 减
U它k H 缓V H T Z
反
2 K h L 半菱贝 6 乌
K 丸 F Z
畏
8、. 精 硝 见便G
喘^ E 见 毒最 密
c性烈最 E 牛 V
丁 E 伤观 硝 a
川乌K乌 犀 人丸最
纳 > i Z 便G
p 逆 k H / G k Z
情
G使 k k G U R !.
G > 它k毒 G 毒性 限
G L增毒u G H T !. 减
U它k H 缓V H T Z
妊娠服 禁忌
健 喘 6 虫 乌头 甘消H天
'喘^并 c 牛膝 E
花代赭麝 p 8!
硝芒硝牡 纳 槐花 牛"角h
半夏# \$ 6 K %麦&姜桃E
'砂& () * 甲] + (肾 Z
陈
枳壳陈皮半夏, 7 8 毒 6 吴萸
般 i k 陈 - 入 k / . / . 0 Z
各
、
、 1 性 Z
养 纳7 8 需白芷苏a防
苍、 2 3 2 细、 4 5 6 姜Z
养 7 8 牛 v f g 9 a '
升7 c d : 木; < Z
7 8 养 : 足 喘痹 E } 钠Z
纳C = 1 经 脉 喘 Z
溢苏、 兼 (7)G Z
a b、 1 > ? w 6 m Z
防、 里 @ P 痹 A Z
「 祛 0 头B C痹Z
白芷 D \$ 带 蛤痛 Z
细、 般 肺味蛤Z
7 8 头4咽 x w ? Z
牛v x w 毒 咽 P E F Z
f t 肺兼@ \$ } 4 G 斑Z
q花 h 4 @ 毒 Z
' ? 升e 匱 : 支陷Z
(1 : Y J x w 紫H 升 匱Z
、

性 疮毒6 # 膈瘟 益]
:
K L (密 M N & . Z I K J
\$ * Q) 0 消花 P s t Z
毒^花_ K 苦丸R 白S Z
R t X Y Z 贯[g T U V W K
^ & c (_ 益 \ 麦] 藤败 K
d e f g 土茯 h 漏 白 i
j c k l m R 半n] 丁 o p k Z
紫] q 赤F 牛角 溢吐 Z
k] 骨皮 ^ * R 蒿 r Z
Z & 1 肺 除~ 饮s t
. 母 ? 肺 桂水 t
O 消 除~ u v 痘<
夏 I K 蛤w x 乌珠 B
8) 肺除 毒 ? y
8 * \$ 益 痢疾疮毒<
8 0 入 晕 支 \$ P
K \$ 支
^ 花 毒 痢毒痢 =
* _ 毒 益x =
T U 毒 蛤痛 z 痢 ! { @
X Y (毒 { : 毒 | 咽喉
V W K 毒 } { : 肺痢
^ & 毒 祛 咽喉 | 钠
白头翁 毒 毒 痢 . { ~
紫] 统水H 崩 足水
q 丸 且 桂水 毒 !.
皮 痈 骨
赤F 兼 除 & 症
] 骨皮 t 肺 妄 Z
、 支苦 p 喘味 > Z
支硝 8 7 E 李 Z
逐喘 p 8 E 毒 伤消p Z
芒硝 便 \$ 咽 疮6 痢 Z
参 逐喘 痈 > ! Z
c 支 喘 祛 咽除 Z
、 祛 k : 痹 F B 医 Z
祛 独 仙 乌头 o 乌 Z
木瓜 骨 骨 防 Z
祛 T 藤 R 防
f C 稀 瓜 Z 山 Z
J 亏 骨 0 皮 寄紫 亏E Z
独 皆祛 头 支C 痹 Z
仙 经 般痹 骨 . Z
o 祛 A 痹7 足 < Z
木瓜除 8 痘骨 > Z
R 除 P 痹兼 喘 痹喘 味 Z
防 P 痹虚晕 痹 喘 y Z
寄紫 P 痹 J 膝 喘 E 痹痿 Z
O 祛 化
、 芳 > 悸苓 最 Z
苍阳 砂 白K K Z
? ! " & 蛤Z
苍阳 \$ 兼 亏苓 痹 Z
除 钠} • Z
y 动 Z
、 利水渗
喘 喘道 喘 v 8 痘 蛤Z
喘蛤 茯苓 泽 冬瓜皮
猪 玉米 U 泽 (0 皮 Z
撮 v 车~ 消 木 K % Z

牛膝 经行 晕 皆支 Z	天7全 x E y z E] Z	菟 消行晕术精 y 4 h Z
整虫 P I J骨足科 RZ	Z J h 镇@ : 4 疾 匱 心 斑 Z	杜仲 J y 元 皆赖 参 行晕 Z
然 C 骨 足 > R Z	牡蛎 镇 : 心 斑 术 涩 ? Z	I 断 J 骨 虚 晕 I y 元 Z
G ~ J 痹 C P 6 9 足 Z	赭 Z 镇 斑 心 钠 Z	行 全 当 或 i 经 秘 Z
K 阳 ? Q E 食 Z	羚角 { { A @ h 4 毒 Z	熟] 行 桂 水 精 潮 精 Z
山甲 经 蛤 支 z 蛤 且 } Z	牛 8 毒 J v Z	白 F 行 柔 i 经 Z
、化 止咳平喘	钩藤 v @ : 心 > ! Z	首乌 行 虚 精 术 晕 精 : 养 早 白 Z
半夏 \$ 白 甘 b 消 " R 花 旋 S	天 7 v A : 斑 心 头 痹 Z	阿胶 行 (桂 水 \$ 水 足 P Z
白 ~ 桔 贝 瓜 蒌 s 8 T 茹	l v : A @ 钠 摄 经 Z	北沙 丸 肺 虚 : \$ } 水 H Z
p 8 k U V 礞 Z 七 壳 W X Z	全 x : w A ? Z	麦冬 统 水 肺 益 除 ~ Z
} @ 钠 冬 花 苏 消 百 Y Z] 茶	、 苏 麝 } ~ . 酥 樟 Z	龟 X 桂 水 匱 亢 亏 骨 统 益 Z
溢 \ f 白] ^ _ 白 、 伤 花 Z	、 : 麝 经 Z	鳖 甲 桂 水 匱 亢 康 Z
半夏 、 \$ 蛤 痞 : 斑 Z	、 虚	、 收 术 涩 脱 麦 7 (稻 Z
桔梗 : 升 a 祛 } 喉 咽 Z	行 k : 水 匱 尿 皆 > 医 Z	肺 涩 期 梅 P 栗 壳 河 榴 皮 Z
川贝 ? 肺 \$ 6 x b Z	行 人 太 消 党 芪 阳 山 k 蜜 饴 糖 Z	Z 禹 余 粮 - } 钠 - Z
c 贝 瓜 蒌 肺 e w d x b Z	p 枣 参 K 白 c 苓 肺 - i 康 Z	木 精 缩 摄 带 k 莢 S f 蛸 Z
DE 苦 } 钠 桂 道 p 便 Z	行 匱 : 晕 匱 鹿 茸 淫 + 杜 G Z 匱 起	、 消 灾 伤 纓 消 精 摄 遗 带 支 < Z
苏 消 ? 7 } 钠 6 便 Z	仙 + 虚 智 非 骨 沙 苑 核 桃 I	期 肺 行 晕 益 钠 - 遗 精 Z
百 Y 肺 : } f 虫 % q h Z	苁 蓉 锁 匱 兔 消 怯 宫 痿 愈 Z	乌 梅 涩 ? 肺 紫 H ? ! Z
f 白 肺 : 钠 喘 蛤 : Z	行 熟] 或 白 F 首 乌 眼 E 阿 胶 Z	山 茱 萸 行 虚 晕 崩 漏 木 精 Z
白 _ 肺 ? 喘 } 钠 味 Z	行 水 百 # 北 沙 榭 榭 玉 s 黑 芝 7	f 螵 蛸 木 精 缩 摄 行 晕 匱 起 痿 > . Z
、	8 精 杞 消 麦 天 冬 早 、 女 贞 鳖 龟 甲 Z	、 消 虚 晕 术 精 带 统 益 亏 苓 > Z
重 镇 、 朱 砂 磁 i j 骨 E a Z	、 丸 行 水 苓 肺 H Z	涌 k 逐 食 毒 w 山 瓜 蒂 E 矾 Z
统 益 Q 枣 E k l m n o 藤 Z	党 九 虚 紫 H 木 喘 托 疮 Z	、 毒 杀 止 痒 白 矾 o) 磺 p 土 a 蒜 蜂 房 Z
朱 砂 毒 镇 益 p (6) 眠 M Z	8 芪 行 且 升 匱 y 祛 喘 Z	8 毒 虫 w o 足 痢 疔 Z
磁 Z 镇 益 q h 4 t 钠 Z	白 阳 行 专 亏 苓 } 钠 遗 6 Z	磺 ? : h \$ - 壮 匱 p 便 Z
骨 镇 p 益 木 涩 @ : 斑 心 Z	山 k 行 水 术 涩 } 钠 遗 6 Z	、 拔 毒 化 腐 肌 升 k # P E 铅 Z 硼 砂 炉 参 Z
酸 枣 E 统 益 虚 P 眠 7 Z	参 K 行 毒 } 生 急 i k 性 Z	升 k 、 > p 毒 R 拔 毒 除 腐 Z
k l 益 祛 亏 r s 6 } Z	鹿 茸 壮 匱 虚 精 i 冲 托 疮 J 骨 Z	
、 平 息	壮 匱 起 痿 淫 + 晕 痹 P Z	
@ 匱 代 赭 Z Z J 珠 母 溢 贝 a		
牡 蛎 t u x 7 斑 心 头 l : Z		
v A : w A 羚 + 牛 8 E 钩 藤		

综合 整法

综 或 j < . 将 j 2 渴 k 1 阴 3 3 (0 & 共 性 ~ 后 * 贯] 进 综 或 金 3 / < 1 l a : ! . R N R < 3 禁 忌 (个 / 面 进 综 或 金 . 带 > 总 性 3 完 j 性 3 G 归 性 3 或 金 / < Z B w 见 : a : P k 物 3 T U M 广 k 3 \$ k B 8) 8 * 8 Q 苦 丸 (毒 k B _ 益 炒 ^ 花 凤 尾 K G a b (k 3 苍 阳 K 里 k 3 & 姜 纳 吴 茱 萸 喘 k 3 伏 车 ~ 消 Z 泽 (Z e { k 物 独 使 R 也 > 3 Q R H T V R 更 > i ! Z . 个 u 3 ! . a : \ 我 们 将 e 5 k 物 或 金 起 来 就 . : 或 金 Z e { k 物 虽 均 > : P 3 共 性 但 由 于 : 症 3 > @ ; 它 们 : P 途 径 . h 3 所 9 殊 途 h 或 Z B 车 ~ 消 Z (1 " Q 便 p 便 " 3 / < : 8) 8 * ^ 花 (1 \$ 角 度 : & 姜 纳 吴 茱 萸 l 亏 苓 3 角 度 : ((Z e 际 . 辨 施 : 3 R k / ; Z F 于 a 他 / 面 3 或 金 B ! . 或 金 际 . 每 章 3 或 金 R < 或 金 u . 先 , 后 支 包 , 烔 捣 汁 浸 泡 P 吞 哮 (e { 3 将 8 支 面 Q 详 细 介 绍 1 供 p 家 8 1 2 渴 k 1 阴 i 后 丸 考 Z

- (一) 主 : 或 金 G R a : 某 : 症 来 或 金 w R k 物 Z
- 1) : 7 w k : 7 8 . 牛 v 消 4 . 升 7 . 5 u . ' (. 樱 桃 核 . s t
 - 2) : & : k 8 t ? 薏 R 蒿 c 瓜 皮 Z
 - 3) : 渊 k 、 夷 猪 3 2 苍 消 Z
 - 4) : 咽 喉 k 山 c (G i ^ & R 元 丸 胖 p 牛 v 消 衣 桔 梗 麦 冬 牛 8 珍 珠 凤 凰 衣 伤 \ 麦 Z
 - 5) : 音 k 衣 胖 p 木 蝴 蝶 R 猴 枣 Z
 - 6) : 视 物 G 花 k : g 花 杞 消 R N 消 J h 消 Z J h . 精 K . n h 砂 . 密 M 花 Z
 - 7) : n 盲 k n h 砂 杞 消 鸡 + 精 K g 花 苍 阳 Z
 - 8) : | } k 川 乌 祖 师 7 + 蹀 蹀 天 仙 消 曼 u 夏 天 角 枫 (7 面 针 徐 长 卿 雪
 - 9) : 痹 症 k 威 仙 独 R 亏 稀 K 木 瓜 皮 . 骨 E y 全 x] 白 b 消 虎 Z
 - 10) : k : 杜 仲 川 断 . f 寄 紫 怀 牛 膝 . 桃 行 骨 Z
 - 11) : 头 k : 白 芷 . 3 2 . 防 . 川 芍 . 9 a 消 J h 消 f t . g 花 . 吴 茱 萸
 - 12) : s 压 k 8) R 木 夏 I K Z J h 天 7 钩 藤 u x 7] 珍 珠 母 Z
 - 13) : 眠 k 酸 枣 E n o 藤 m 皮 林 米 i j 朱 砂 珍 珠 母 a 丸 k l 磁 Z Z
 - 14) : k 细 、 Z & 白 芷 蜈 a b Z
 - 15) : k s 姜 > 索 白 F 螵 蛸 象 贝
- 拔 丁 纳 川 乌 K 乌 Z
- 16) : 食 k : 鸡 伤 麦 芽 芽 曲 山 消 E 寄 F
 - 17) : k 姜 半 夏 姜 汁 苏 梗 砂 E 代 赭 Z 手 片 代 代 花 瑰 花 5 益 土 川 * 紫 姜 Z
 - 18) : 呃 逆 k 丁 柿 蒂 s 茹 c 消 韭 消 Z
 - 19) : k 赤 Z 禹 余 粮 c 诃 消 Z 榴 皮 罂 粟 壳 乌 梅 P 消 h 矾 S 皮 Z
 - 20) : 痢 疾 k 8 * 8) 8 Q R 皮 白 头 翁 k 消 苦 丸 G a b . 槟 榔 . 翻 白 K . 凤 尾 K .] c K . 仙 K . _ 益 . 炒 ^ 花 . K
 - 21) : 脱 肛 k 8 芪 枳 壳 槐 米 P 消 升 7 Z
 - 22) : | } m k 溢 珠 K 仙 K 白 6 余 4 0 桐 4 花 紫 衣 1 墓 头 回 鸡 冠 花 缓 景 天 缓 花 / Z Z
 - 23) : 便 k 槐 米 仙 K]) 侧 Q t 5 益 土 1 Z
 - 24) : 摄 k 白 + (p 薊 Q 薊 1 仙 K - K Z
 - 25) : 肺 癆 k 百 Y 律 K 天 消 獭 V W K 夏 I K 猫 * K] 骨 皮 + Z
 - 26) : \ k : 7 8 (Q 麦 糯 稻 (骨 牡 蛎 防
 - 27) : k R 蒿] 骨 皮 鳖 甲 白 r ^ 8 * Z
 - 28) : 贫 k 阿 胶 当 或 7 首 乌 眼 8 芪 早 \ K 女 贞 消 黑 枣 杞 消 f 甚 Z
 - 29) : 钠 k 7 8 白 f 白 皮 ^ _ 消] 闹 + 花 冬 虫 夏 K 桃 七 蚘 @ 直 丸 溢 河 车 溢 Z U Z

- 30) : }嗽k DE 象贝 溢[冬 G\] t 百Y 40) : wk] 消 白 皮 车~消 川 g花 炉参
百 #天 消Z
31) : 喘k 冬瓜皮] 车~消 %麦 冬 41) : o 足k 半n` d 天#\$Z
消 虚母K ij 泽? 玉米U 泽 p 皮 : Z 42) : 喘 8 足k p 8] p Z 喘 (般 R) \T56/365958.B2 2 T 48
32) : 8痘k 茵陈 伤 K] K K 虎 G, 伤 43) : y动
天 4 伤 p 8 Z
33) : 摄 Z 伤 K 伤沙 (p 8 虚母K 伤 玉
米U Z 鸡 伤Z
34) : 便秘k p 8 元h P t 7 E 李E 蜂蜜
黑白 乌Q (皮 c 苁蓉 紫首乌 花 参 Z
35) : 痢k]藤 冬瓜E . TU 白 夏IK * _ 白花
o p K Z
36) : z痢k . TU 橘t 橘核 Q _山甲 王 留
伤 全瓜蒌 尾K 喘K Z
37) : 肺痢k: 伤\麦 冬瓜E m R VWK 人 8 花 / Z Z
38) : 疮痢k 溢花]丁 . TU g花 里 m R
^花 夏IK 白 夏IK Z
39) : 痢k 山fg 猫人丸 WX 8 k 消 & • 皮
K 阳 y 阿 白胶 Z

=> ?> y 3 k 物 . 砂 E 14+ I J 骨 虫 然 C 骨 H 行 断 I
 => ?> 匱 3 k 物 . 吴茱萸 => I J 骨?> 逐 3 k 物 . 虫
 13+ 金 @ 钠 行骨 磁 Z => I J 骨?> 行晕 3 k 物 . 骨 H 行
 => 金 @ 钠?> 3 k 物 . => I J 骨?> 3 k 物 . 然 C
 => 金 @ 钠?> 行晕 匱 木精缩 3 k 物 . 行骨 => I J 骨?> 行 晕 y 3 k 物 . 断 I
 => 金 @ 钠?> 镇 p q h 4 3 k 物 . 磁 Z

、特殊疗效

1 4 珠 B 夏 I K 经 y 6 t 厥水 吴茱萸
 骨 喉 威 仙 木经 y 杜仲 8 痹 匱 薤白 枳 瓜蒌
 木瓜 统 y 断 I f 寄紫 e
 8 疸 茵陈蒿 山 虚 y 白阳 亏苓 9 痢 肺痢 V W K (_ 益` 败 K
 满 虚智 E 苓 7 3 祛 " R 毒 A 牛 8 桃 E 桔梗 贝母 c 瓜蒌 E
 回 z 麦芽 蛤 z 山甲 木 v 益 祛 k l 皮 痢] 藤 败 K 白花 o p K
 梅毒 土茯 白 M 益 祛 k 麝 . } 片 . 苏 . Z ~ . . . 8 芒硝 E 溢花] 丁 瓜蒌 p
 肺 m 白]) 槐花 z 痢 . T U 川贝母 瓜蒌
 便 ! 厥 乌梅 ? 4 h 4 h 4 g 花 f t R 皮 羚+角 车 10+ ? . 母 8 Q 牡
 苓 n 盲症 苍阳 牛膝 ~ 消 J h 消 夏 I K 珍珠母 h 皮] 骨皮 R 蒿 R ? 于 R 皮 8 *
 或 支 纳 头 4 支 女科 i 甘 专: 身 11+ 苍 消 细` ` 夷 白芷
 : i 总 女科 i 咽 咽 音 咽 桔梗 河消 12+ 症 R 蒿 紫首乌 w 山
 [> \ > 索 6+ 升匱 S V 症 h 消宫支 升 7 13+ @ 行水匱 菟 消 沙苑消 山茱萸
 支 & v 伤 K 欲脱 脉 欲 人丸 14+ 喘 虚母 K 牛膝
 Z v 匱 回匱救逆 甘消 15+ 肺痹 } 嗽 百 Y
 2 y y 溢苏 砂 E 7 头 太匱 匱 h ~ D [3 2 9 a 消 16+ 往来 t
 y 8) * 7 (7 头 太匱 匱 h ~ D [3 2 9 a 消 17+ @ t
 行 晕 y f 寄紫 杜仲 断 I 菟 消 18+ 行肺 苓 晕 山 k
 y * 7 (升匱 支陷 脱肛 8) 消 19+ 丸 Z ~ . 珍珠母 期
 太水 苍阳 20+ x b 核 夏 I K q 丸 8 k 消
 m 水 细、 半夏 # \$ W X 川贝母 c 贝母
 物不同品种功效的偏向 21+ w d W X . . 8 k 消 半夏 c 贝母

、物不同品种功效的偏向

1+ 防 法 喘蛤 蛤 ① - K 科
 木防 法 5+ 0 皮 行 晕 J 骨 0 科 物 0 3 (皮 行
 防 喘 t 行 晕 J 骨 支 晕 J 骨 摄 北 0 > 毒 > J 益 摄 科 物 u 3 (皮
 2+ 牛膝 行 晕 J 骨 益 t 8 6+ 祛 除
 怀牛膝 行 晕 J 骨 川牛膝 法 熟 楝 身 法 由 乌芽 阿 乌茹 由 乌芽 阿 乌茹 楝 丁 乌芽 母 桃 茶 逐 蒂
 3+ 伤 8 伤 伤 7+ g 花 @ h 4 毒
 广 伤 8 伤 8 g 花 g 花 苦
 川 伤 黑 伤 白 g 花 g 花 @ h 4 参
 PS 片姜 8 产于 c 3 伤 3 (g 花 毒
 K 阳 蛤 K 阳 伤 3 (4+ p
 p 支逐喘 J p 科 喘逐味 蛤

、名相近

1+ 吴茱萸 行虚 晕 木涩 匱 R 祛 痹 6 t f 0 16 89 T f 8.4 0 * T D (0) T i / F 5 + 3.6 T D - 0.3 T D (30) T i / F 5 + 5. r T D - 0.3 T D
 山茱萸 行虚 晕 木涩 匱 8+ 防 养 祛 10 1 3 9 续 3 喘蛤 肺 } 姜 11+ 除 芽 虫 芽 K 仙 K 3 冬芽
 2+ 白 c 涩 @ 祛 h 4 行晕木 3 (& 姜 3 & \$ (s 姜 3 (3
 c 沙苑消 t 沙苑 t 行晕木 3 (& 姜 3 & \$ (s 姜 3 (3
 精统 h 4 4+ 8 * \$ 毒 8 * t 除 " 升匱 e 陷 3 姜 经 姜 3 & \$
 5+ ^ 除 " 3 姜 经 姜 3 & \$
 6+ 紫 8 行 桂水 统水紫 H 紫皮 苓 喘蛤 紫姜 (切支
 熟 8 行 桂水 统水紫 H 3 皮 虫 P \$ 川楝 3 _
 7+ R 皮 \$. 毒 痢 带 h 4 10 川楝 消

人丸 p 行元 .行零市.紫H. 西`丸 行 统水 紫H 党丸 虚 紫H 统 太消丸 行 统水 肺 虚 紫H 北沙丸 统水 肺 虚 紫H #沙丸 统水 肺 虚 紫H 15+ 期消 肺 桂晕 紫H 涩精 M 益	P 消 肺 涩 木精 遗 16+ f 螭蛸 木精缩摄 行量 匱 螭蛸 木精 带 酸 疮 17+ 7 8 养 a肺@ 钠 喘蛤 7 8 (肺 18+ 牛 8 v A 毒	8 毒 虫 8 毒 虫 ? 行 匱 便 19+ g 花 @ h 4 毒 g 花 毒 20+ 土伏 毒除 F 茯 喘 亏苓 猪 喘
牛 8 入哮 每 0.2-0.5g 羚+角 , - 1-3g 汁 P - 每 0.3-0.6g 麝 入哮 每 0.06-0.1g • 入哮 每 0.015-0.03g 8 入哮 1-3g	8 入哮 每 0.15-0.3g c 入哮 每 0.1-0.3g Z 入哮 每 0.002-0.004g 朱砂 入哮 冲 - 每 0.3-1g 细` , - 2-5g 入哮 0 0.5-1g G 消 入哮 - 0.3-0.6g	人丸 救 脱 15-30g Z & , - 15-60g H先, - 紫R R 参 入哮 每 0.5-1g 槟榔 R 虫 60-120g
1后支 5 7 8 紫p 8 砂E 白c 纳 t.钩藤.VWK.R蒿 2先, 贝壳 Z 5 k物 喘牛角 紫Z & 紫磁Z 珍珠母 骨 Z J h 龟X 鳖 甲 牡蛎 代赭Z 甘消 川乌 紫然C 3冲 - 芒硝 s T i j P 4泡 - t 5 入, 0 哮(1白酶) i j .朱	砂.牛 8. k(麝 .)片.苏 .•) 6只 R - 升k 炉参Z 土a皮 7入哮 麝 }片 苏 • 朱砂 牛 8 i j c G 消 哮 羚 +角 D 参 8. 8. Z. K芽 8包, 车~消(熟}消). 伤沙(熟孢 消). 8(花P). (粪便)] t 飞 Z.旋S花.^_消赤Z .`夷	9+ -, 钩藤 10+另, 兑 - 羚+角 人丸 西`丸 11+烱 兑 - 阿胶 12+ - c 13+ 参 14+焗 - 纳
1+朱砂 >毒 1过N 忌 2+使j 消 p N - R 1 呃逆 斑心	、使用注意 h - > 起呃逆 (L V E 茶 3+ F 木 60g 喘,	- R p 当忌味茶 1 急性晕! > D
`夷 木笔花 春花 伤^花 双花 宝花 忍冬花 - K 茹虑 虑茹 骨H 行 姜 申姜 猴姜 y 天虫 姜虫 牛v 消 p 消 鼠粘消 ^& 乌扇 淫+ ! 仙 苓 行骨 纸 山茱萸 枣皮 山萸 螭蛸 乌;骨	. T U 8花]丁 7 E 7 消E p 7 E E 米E E 牛 8 宝 西 8 犀 8 t 白t 白夕 麝 元寸 当门消 槟榔 p 消 花槟榔 沙苑消 t 沙苑 t 诃消 诃黎勒 煨诃消 虫] 螫虫 土螫虫 川楝消 伤 消	仙 K 芽K 脱 K 8 k 消 8 k 牛消 黑 白 _ 益、 榄核、 见喜 苦 K 玉s 葳蕤、 p 8 川军 c 纹 p 8 4 古 今 K 木 脱木 K
P 消 虫w f 螭蛸 卵鞘 螭蛸 乌; 壳 伤沙 粪便 K芽 孢消 冬芽 . 8 花P `夷 花蕾 丁]骨皮 杞3 (皮 h & \$ 汁	、用部位 f 寄紫 带 t C 茯 猪 菌核 哮 _山甲 鳞片 甘消 消(薤白 百 贝母 鳞 s茹 3 q层 i j Z I物] z I k D 骨 Z 麝 _熟 c 囊 3 & \$ 4 泌物	• 后腺6皮 腺4泌3白0浆液经 0工&\$ { _ 牛 8 Z 禹白甘 8 k 消 块 鹿茸 鹿3幼角 Z J h 牡蛎 贝壳 溢河车 y 盘 [天花P 栝蒌3块(瓜蒌 栝蒌3